

H.P. **Acthar**<sup>®</sup> GEL  
(repository corticotropin injection) 80 U/mL

**CUANDO BUSCA APOYO  
PERSONALIZADO**



El gel H.P. Acthar<sup>®</sup> (repository corticotropin injection) está indicado para la reducción de la proteinuria en las personas con síndrome nefrótico de tipo idiopático (origen desconocido) sin uremia (acumulación de urea en la sangre debido a una disfunción de los riñones) o aquel provocado por el lupus eritematoso (lupus).

Consulte la Información de seguridad importante en el reverso y la Información de prescripción completa adjunta.

## Capacitación personal con enfermero diseñada para brindarle apoyo durante el tratamiento con Acthar

Si tiene preguntas o desea obtener apoyo durante la terapia, el equipo de capacitación del paciente y Acthar, **ActharPACT (Patient & Acthar Coaching Team)**, es una fuente de información y apoyo para usted. Este folleto le guiará por los pasos y le explicará qué servicios tiene ActharPACT disponibles sin costo alguno para usted.

Es importante que comprenda por qué le han recetado Acthar. Asegúrese de hablar con su médico sobre su diagnóstico y qué debe esperar del tratamiento con Acthar.

### Estas son 3 maneras fáciles de inscribirse:



Enviar la **tarjeta adjunta** por correo



Visitar el sitio web: **ActharPACT.com**



Llamar en forma gratuita al: **1-888-419-8482**

**Los enfermeros tutores ActharPACT no brindan asesoramiento médico. Si tiene preguntas específicas sobre su diagnóstico o su plan de tratamiento individual, comuníquese con su proveedor de atención médica.**

### Programa ActharPACT

**Una vez inscripto para ActharPACT, recibirá apoyo personalizado de un enfermero registrado capacitado en enfermedad renal, proteinuria y el tratamiento con Acthar.**

**Su tutor se comunicará con usted para ofrecerle servicios que incluyen:**

- Capacitación telefónica en más de 20 idiomas\*
- Comunicaciones personalizadas con información sobre el tratamiento con Acthar y recordatorios sobre su próxima llamada de ActharPACT y sobre las próximas inyecciones de Acthar
- Respuestas a sus preguntas sobre tratamiento y acceso a servicios adicionales si desea obtener más información
- Acceso a un sitio web interactivo diseñado para pacientes de Acthar que incluye actividades para aprender, resolver problemas, establecer objetivos y realizar un seguimiento del tratamiento



Para ofrecer apoyo y ayudarlo a mantenerse motivado, su tutor se mantendrá en contacto con usted durante todo el tratamiento. Las llamadas, los correos electrónicos y los mensajes de texto pueden ser con la frecuencia que solicite, con la posibilidad de cancelar el servicio en cualquier momento.

\*Los servicios de traducción telefónica disponibles en todos los idiomas pueden variar para las llamadas no programadas. Para garantizar la disponibilidad, es mejor solicitar el servicio en el momento de la inscripción.

# “Las llamadas, los recordatorios y el apoyo de ActharPACT realmente me ayudan a sentir que puedo manejar mejor las cosas.”

—paciente de Acthar

Acthar viene con un amplio programa de apoyo diseñado para ayudarle a comenzar y continuar con su tratamiento. Los servicios adicionales disponibles incluyen:

● **A.S.A.P. (Programa de apoyo y acceso de Acthar),**

un servicio sin costo proporcionado por el distribuidor de Acthar que:

- Trabaja directamente con el proveedor de atención médica para ayudar con la cobertura del seguro
- Se comunica con la compañía de seguros para garantizar el mejor seguro con el menor copago posible

**PROGRAMA DE APOYO  
Y ACCESO DE ACTHAR**  
A.S.A.P.

● **Servicios de capacitación de la inyección de Acthar en el hogar (Home Injection Training Services, HITS),**

un servicio sin costo que brinda una sesión de capacitación de la inyección en el hogar con un enfermero registrado para usted o su cuidador

- Su médico puede solicitar esto directamente en el formulario de prescripción o puede solicitar la visita de un enfermero cuando hable con A.S.A.P.



Para obtener más información sobre **A.S.A.P.** o **Acthar HITS**, visite **Acthar.com** o llame al **1-888-435-2284**.

Su médico es su fuente principal de información sobre su tratamiento. Hable con su médico si tiene alguna pregunta sobre su tratamiento o su afección.

## Información de seguridad importante

**Acthar se inyecta debajo de la piel o en el músculo. Nunca debe inyectarse en una vena.**

**No debe tomar Acthar bajo las siguientes circunstancias:** si tiene una afección de la piel llamada esclerodermia, pérdida de densidad ósea, alguna infección, infección ocular denominada herpes ocular simple, si tuvo una cirugía reciente, si tiene úlceras estomacales o antecedentes de úlceras, problemas cardíacos, presión arterial alta o alergia a las proteínas derivadas del cerdo. Informe a su médico si está embarazada o planea quedar embarazada.

**Mientras toma Acthar, informe a su médico si tiene alguno de estos síntomas:** infecciones; cambios en la glándula suprarrenal, que puede ocasionar síntomas del síndrome de Cushing, como grasa en la parte superior del cuerpo, rostro redondo “de luna,” hematomas que se forman con facilidad o debilidad muscular; aumento en la presión arterial, las sales del cuerpo y los niveles de líquido; respuesta impredecible a las vacunas; problemas estomacales o intestinales; cambios en el estado de ánimo o la conducta; empeoramiento de otras afecciones; problemas oculares; o reacciones alérgicas. Informe a su médico acerca de cualquier problema de salud o sobre cualquier otro medicamento que esté usando.

**Acthar puede ocasionar efectos secundarios similares a los de los tratamientos con esteroides.**

**El uso de Acthar puede enmascarar síntomas de otras enfermedades** y puede causar **pérdida de la densidad ósea** a cualquier edad.

**Los efectos secundarios más comunes incluyen:** retención de líquidos, cambios en el nivel de azúcar en sangre, aumento en la presión arterial, cambios en el comportamiento o el estado de ánimo, y cambios en el apetito y el peso.

**Los efectos secundarios específicos en niños menores de 2 años incluyen:** aumento del riesgo de infecciones, aumento en la presión arterial, irritabilidad, síntomas del síndrome de Cushing, hipertrofia cardíaca (engrosamiento del músculo del corazón) y aumento de peso.

Los efectos secundarios mencionados anteriormente también pueden observarse en adultos y en niños mayores de 2 años de edad.

**Estos no son todos los efectos secundarios posibles de Acthar.**

**Informe a su médico sobre cualquier efecto secundario que le moleste o que no desaparece.** Llame a su médico o farmacéutico para obtener consejos médicos sobre los efectos secundarios. **Puede informar los efectos secundarios a la FDA. Llame al 1-800-FDA-1088 o visite [fda.gov/medwatch](http://fda.gov/medwatch).** También puede informar los efectos secundarios llamando al 1-800-778-7898.

**Consulte la Información de seguridad importante completa para pacientes en [Acthar.com](http://Acthar.com).**

**Visite [Acthar.com/HCP/PrescribingInformation](http://Acthar.com/HCP/PrescribingInformation) para obtener la Información de prescripción completa.**



**H.P. Acthar<sup>®</sup> GEL**  
(repository corticotropin injection) 80 U/mL